

KỸ THUẬT TRỒNG HOA LY LY

1. Thời vụ trồng

Ở các vùng như Đà Lạt, Sa Pa có thể trồng quanh năm, ở đồng bằng, vùng núi phía bắc có thể trồng 2 vụ: Vụ thu đông tháng 9 – 10 và vụ đông xuân tháng 11 – 12.

2. Làm đất

Có thể làm đất thủ công hoặc làm đất cơ giới (máy phay đất); Trước khi trồng hoa lily cần phải chuẩn bị chu đáo và làm sờm. Đối với những chất đất vụ trước trồng cây trồng cạn (cây hoa khác) cần phải chặt cây sờm vệ sinh kỹ càng.

- Vệ sinh đất biện pháp thủ công: Ngǎ đất sờm hoặc nơi nào có điều kiện tốt nhất dọn bờ xung quanh mảnh đất định trồng, bơm nước ngập hai ba lần sau đó đợi đất khô thì cày bừa.

Bón vôi cho đất có tác dụng khử trùng đất. Lượng bón từ 20 – 25 kg/sào – 50 kg/ha, rắc đều mặt luống sau đó xới xáo đều.

Biện pháp hóa học: Có thể dùng CuCl₂ phun nồng độ 0,2-0,35%, vệ sinh đất tốt là khâu quyết định đầu tiên để trồng vụ hoa lily thắng lợi.

Cách làm đất: Đất cần được cày phay, đập kỹ, vơ sạch cỏ dại và các tàn thực vật. Đất được lên luống rộng 0,9 – 1,0m; rãnh đi lại chăm sóc 0,45m.

Mật độ cây trồng có thể 20 x 15 cm; 11.200 củ/sào – 310.000 củ/ha.

Khi trồng nên lấp đất vừa phải 4 – 5 cm, nếu lấp sâu quá cây khó mọc.

3. Phân bón cho 1 ha

- Phân hoai mục: 15 – 20 tấn
- Lân: 150 – 200 kg
- Kali: 150 – 200 kg
- Đạm: 120 - 150 kg

Cách bón

- Bón lót: Bón toàn bộ phân chuồng hoai mục, 3/4 lượng phân, 1/4 lượng kali, 1/4 đạm.

- Bón thúc: Số lượng lân còn lại ngâm vào hố sau đó hoà thêm đạm và kali với nước để tới thêm nhiều lần, cứ 10 – 12 ngày bón thúc 1 lần. Đối với lily nên bón các loại phân vi lượng có chứa: Ca, Co, Mg, Mn...

Ngoài ra cần phải tăng cường thêm phân bón lá: Komix, Antonix...

Chăm sóc, tưới nước

Nên thường xuyên giữ đất ẩm 70 – 72%

- + Thường 1 – 2 ngày tới 1 lần.
- + Khi cây mọc khỏi mặt đất ta nên xới nhẹ kết hợp bón phân loãng, khi cây nhú hoa ngừng xới xáo.

4. Phòng trừ sâu bệnh

a. Bệnh vết trăng lá

Đặc điểm triệu chứng: Vết bệnh lúc đầu nhỏ như mũi kim về sau to dần có dạng hình bầu dục, ở giữa màu trăng xám, bên ngoài có viền màu nâu sẫm. Bệnh thường có ở lá bánh tẻ, lá già, trên mô vết bệnh thường hình thành chấm màu nâu đen đó là các quả càنه của nấm gây bệnh, bệnh nặng làm lá vàng chóng lui.

Nguyên nhân gây bệnh do nấm Septoria gây ra.

b. Bệnh thán thư

Đặc điểm triệu chứng: Vết bệnh thường có hình dạng hơi tròn nhỏ, hình từ chóp lá hoặc ở giữa phiến lá, ở giữa vết bệnh màu xám nhạt hơi lõm xung quanh có viền màu nâu đỏ hoặc đen trên mô bệnh, giai đoạn về sau thường hình thành các hạt đen nhỏ li ti là đĩa càne của bệnh. Bệnh thường hại trên lá già, lá bánh tẻ.

Nguyên nhân gây bệnh: Do nấm Collectotrichum SP. gây ra.

c. Bệnh thối xám

Đặc điểm triệu chứng: Bệnh do vi khuẩn tác động vào bộ phận gốc rễ làm thối gốc rễ, vết bệnh có hình bất định màu trăng đục, cây bị bệnh lá héo rũ tai xanh, thường héo từ lá gốc lên các lá trên, bó mạch thâm đen, có dịch nhầy trắng như sữa tiết ra khi bấm ngang chỗ cắt.

Nguyên nhân gây bệnh: Do vi khuẩn Pseudomonas marginata gây ra.

*** Một số biện pháp phòng trừ bệnh hại lily**

- Lựa chọn giống cây chống chịu bệnh.
- Luân canh cây trồng.
- Chọn nơi đất khô ráo.
- Bón phân N.P.K thích hợp.

Khi bệnh phát sinh cần phòng trừ kịp thời bằng các loại thuốc hóa học.

- Đối với cây bệnh do vi khuẩn gây ra cần chú ý công tác luân canh, nhổ bỏ cây bệnh, diệt trừ cỏ dại và phòng trừ cơ giới truyền bệnh. Ngoài ra có thể dùng một số thuốc kháng sinh trừ vi khuẩn như: Streptomixin nồng độ 100 – 150 ppm.

- Với các bệnh thối héo, mốc xám ta có thể dùng TopSin – M 70 NP với liều lượng 50 – 100 g/100 lít nước (pha 5 – 10 g trong 1 bình 10 lít).

*** Sâu hại**

Một số loại sâu chủ yếu thường hại lily là sâu xám và sâu xanh cắn...

Đối với các loại sâu hại này biện pháp chủ yếu là luân canh cây trồng khác như lúa nước và luân canh với một số cây trồng cận.

Ngoài ra còn có thể dùng một số thuốc trừ sâu Deis 2,5 EC, nồng độ 0,3%; Ofatox 400 EC liều lượng 1 – 1,5 lit/ha; Snmicidin 20 EC, Pegasus 500 DD liều lượng 0,5 – 1,0 lít/ha.

5. Thu hoạch

- Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng mà thu hoạch ở các độ nở hoa khác nhau. Thông thường khi cành hoa có 1 – 2 búp hé nở. Khi cắt hoa nên để lại tối thiểu 4 lá để cây tiếp tục nuôi củ sau này.

- Nên cắt hoa vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối. Nên cắm hoa vào nước nếu chuyển đi xa phải đóng hộp và phân loại hoa./.

Nguồn Internet